

Impfung gegen Blauzungenkrankheit

Krankheit:

Die Blauzungenkrankheit (Bluetongue BT) ist eine Viruserkrankung der Rinder, Schafe, Ziegen und Kameliden, die durch stechende Insekten (Steckmücken) übertragen wird. Für den Menschen ist die Krankheit nicht gefährlich. Milch und Fleisch kann weiterhin bedenkenlos konsumiert werden.


Je nach Serotyp kann die Krankheit unterschiedlich verlaufen. Tendenziell verursacht die Infektion mit dem Blauzungenvirus Serotyp 3 (BTV-3) schwerere Symptome als die Infektion mit dem Serotyp 8 (BTV-8).

Folgende Symptome können auftreten:

- Fieber
- Entzündungen der Schleimhäute mit schaumigem Speichelfluss und Nasenausfluss
- Atembeschwerden
- Schluckbeschwerden
- Ödeme im Kopfbereich und an den Extremitäten
- Lahmheit
- Fehlgeburten

Die Sterblichkeit kann sehr hoch sein. Bei Rindern verläuft die Krankheit oft milder. Die Tiere können auch einen Rückgang der Milchleistung zeigen.

Verbreitung der Krankheit in der Schweiz, Stand Oktober 2024:



Impfung/Impfempfehlung:

Die Impfung gegen die Blauzungenerkrankung erfolgt auf freiwilliger Basis und auf Kosten der Tierhaltenden.

Ein vollständiger Schutz wird durch die Impfung nicht erreicht, d.h. die Impfstoffe schützen die Tiere nicht vor einer Infektion und Virämie. Sie können aber zu mildereren Krankheitsverläufen und zu einer Reduktion der Sterblichkeit führen.

Die Impfung ist zurzeit die einzige wirksame Massnahme zum Schutz der Tiere vor einem schweren Krankheitsverlauf. Eine Impfung der Tiere wird daher dringend empfohlen.

Es ist davon auszugehen, dass BTV-3 auch im kommenden Jahr in der Schweiz zirkulieren wird.

Für einen bestmöglichen Schutz der Tiere im Hinblick auf die Vektorsaison 2025, sollte die Grundimmunisierung bei Rindern im Zeitraum von Januar – März 2025 erfolgen, bei Schafen im Januar – Februar (vor Beginn der Ablammsaison).

Bei allen drei genannten Impfstoffen wird für die Grundimmunisierung eine **zweimalige** Impfapplikation im Abstand von 3-4 Wochen empfohlen. Die Immunität beginnt ca. 3-4 Wochen nach Abschluss der Grundimmunisierung.

Grundimmunisierung Rinder (mind. Alter 4-6 Wo)

Zweimalige Impfung im Abstand von ca. 4 Wochen
Zeitraum: Januar – März 2025

Grundimmunisierung Schafe (mind. Alter 4-6 Wo)

Zweimalige Impfung im Abstand von 3-4 Wochen
Zeitraum: Januar – Februar 2025

Kosten:

5 Franken pro Dosis, entspricht 10 Franken pro Tier

Fragen/Interesse:

Bei Fragen/Unklarheiten wenden Sie sich bitte an uns

Bei Interesse für der Impfung, melden Sie bitte die gewünschten Dosen bis Ende November bei uns an

Quelle Impfempfehlung:

Empfehlungen bezüglich Impfung von Tieren gegen das Blauzungenvirus vom Serotyp 3, gemäss BLV, GST u. Vereinigung der schweizerischen Kantonstierärzte/-innen)